

Tabela 5 – Diretrizes de recomendação de uso de contraceptivos apenas de progestagênio em mulheres lactantes e não lactantes

Métodos	Critérios* de Elegibilidade da OMS (21, 37)	Critérios* de Elegibilidade do CDC – Estados Unidos (62)	Critérios* de Elegibilidade do Reino Unido (63)
Lactantes	< 6 semanas: 3 6 semanas a 6 meses: 1 > 6 meses: 1	< 21 dias do parto (com ou sem fatores de risco de TEV**): 2 21 a < 30 dias do parto (com ou sem fatores de risco de TEV): 2 > 30 dias do parto (com ou sem fatores de risco de TEV): 1	< 6 semanas: 1 (POP e implante), 2 (AMPD), 3 (SIU-LNG) 6 semanas a 6 meses: 1 > 6 meses: 1
Não Lactantes	< 21 dias do parto (com ou sem fatores de risco de TEV): 1 ≥ 21 dias do parto (com ou sem fatores de risco de TEV): 1	< 21 dias do parto (com ou sem fatores de risco de TEV): 1 ≥ 21 dias do parto (com ou sem fatores de risco de TEV): 1	< 21 dias do parto (com ou sem fatores de risco de TEV): 1 ≥ 21 dias do parto (com ou sem fatores de risco de TEV): 1

CDC: Centers for Disease Control and Prevention; OMS: Organização Mundial de Saúde

*Critérios: 1: sem restrição, 2: os benefícios superam riscos; 3: os riscos superam os benefícios, 4: risco inaceitável.

** Fator de risco adicional para TEV: obesidade, tabagismo, pós-parto de cesariana, pré-eclâmpsia na gestação, transfusão, imobilidade, trombofilia e hemorragia puerperal.